

Vitaminkonzentrate mit β -Carotin

Zur Verbesserung der Fruchtbarkeit bei Milchkühen, Schweinen und Stuten ist bei Rationen mit geringen Anteilen an Grünfutter bzw. an Grassilagen eine Ergänzung mit β -Carotin zu empfehlen. β -Carotin wirkt sich positiv auf das Follikelwachstum, den Eisprung und die Entwicklung des Gelbkörpers aus.

Mit der Verfütterung von β -Carotin sollte bereits vor der Geburt begonnen werden, um das Immunsystem des Muttertieres zu stimulieren und um den Antikörpergehalt des Kolostrums zu steigern.

Produkt	Blattiviko Beta plus	Blattiviko Beta 4000	Blattiviko Beta 3000
Eigenschaften	Wasserlösliches Pulver	Pulver	Pulver
β-Carotin	8.000 mg	4.000 mg	3.000 mg
Vitamin A	1.000.000 I.E	600.000 I.E.	100.000 I.E.
Vitamin E	6.000 mg	3.500 mg	10.000 I.E.
Vitamin B12	10.000 μ g	-	500 μ g
Cholinchlorid	10.000 mg	-	-
Nikotinsäure	-	-	40.000 mg
Selen	-	-	30 mg

Fütterungsempfehlung

- Milchkühe:**
- 200 mg β -Carotin 14 Tage vor der Geburt bis 3 Wochen nach der Geburt
 - 400 mg β -Carotin 3 Wochen nach dem Abkalben bis zur erfolgreichen Besamung
- Zuchtschweine:**
- 300 mg β -Carotin 4 Tage vor dem Absetzen der Ferkel bis drei Wochen nach dem Belegen
- Jungsauen:**
- 300 mg β -Carotin 10 Tage vor dem angestrebten Deckzeitpunkt bis drei Wochen danach
- Stuten:**
- 400 mg β -Carotin 14 Tage vor dem Abfohlen bis 3 Wochen nach der Bedeckung